

# 福岡病院臨床検査基準値

2017.6.1

## 生化学検査

検査項目	基準値	単位
総蛋白	6.6-8.1	g/dl
アルブミン	4.1-5.1	g/dl
グロブリン	2.2-3.4	g/dl
A/G比	1.32-2.33	
総ビリルビン	0.4-1.5	mg/dl
直接ビリルビン	0.0-0.2	mg/dl
ZTT	1-13	K-U
アルカリフォスファターゼ	106-322	U/l
コリンエステラーゼ	男 240-486 女 201-421	U/l
AST	13-30	U/l
ALT	男 10-42 女 7-23	U/l
γGT	男 13-64 女 9-32	U/l
LD	124-222	U/l
CK	男 59-248 女 41-153	U/l
アミラーゼ	44-132	U/l
グルコース	73-109	mg/dl
尿酸	男 3.7-7.8 女 2.6-5.5	mg/dl
尿素窒素	8-20	mg/dl
クレアチニン	男 0.65-1.07 女 0.46-0.79	mg/dl
総コレステロール	142-248	mg/dl
HDLコレステロール	男 38-90 女 48-103	mg/dl
LDLコレステロール	65-163	mg/dl
中性脂肪	男 40-234 女 30-117	mg/dl
カルシウム	8.8-10.1	mg/dl
無機リン	2.7-4.6	mg/dl
マグネシウム	1.7-2.4	mg/dl
鉄	40-188	μg/dl
ナトリウム	138-145	mmol/l
カリウム	3.6-4.8	mmol/l
クロール	101-108	mmol/l
アンモニア	12-66	μg/dl
HbA1c	4.9-6.0	% (NGSP)

## 血液検査

検査項目	基準値(成人)	単位
WBC	3.3-8.6	X10 <sup>3</sup> /μl
RBC	男 4.35-5.55 女 3.86-4.92	X10 <sup>6</sup> /μl
HGB	男 13.7-16.8 女 11.6-14.8	g/dl
HCT	男 40.7-50.1 女 35.1-44.4	%
MCV	83.6-98.2	fl
MCH	27.5-33.2	pg
MCHC	31.7-35.3	%
PLT	158-348	X10 <sup>3</sup> /μl
網状赤血球	5-20	%
白血球分類	好中球 40.0-74.0 リンパ球 19.0-48.0 単球 3.0-9.0 好酸球 0-7.0 好塩基球 0-1.5	%
好中球	1.90-8.00	X10 <sup>3</sup> /μl
リンパ球	0.90-5.20	X10 <sup>3</sup> /μl
単球	0.16-1.00	X10 <sup>3</sup> /μl
好酸球	0-0.80	X10 <sup>3</sup> /μl
好塩基球	0-0.20	X10 <sup>3</sup> /μl

## 凝固・線溶検査

検査項目	基準値	単位
出血時間(Duke法)	1-4.5	分
PT	秒 11-14.5 % 70-130	秒
APTT	23-44	秒
フィブリノーゲン	146-380	mg/dl
FDP	5以下	μg/dl
トロンボテスト	70以上	%
ヘパラスチンテスト	70-130	%

## 免疫血清検査

検査項目	基準値	単位
CRP	- ≤ 0.14 ± 0.15-0.59 + 0.60-1.49 2+ 1.50-2.99 3+ 3.00-6.49 4+ 6.50-10.99 5+ 11.00-17.99 6+ 18.00-24.99 7+ ≥ 25	mg/dl

## 免疫グロブリン

検査項目	基準値(成人)	単位
IgG	861-1747	mg/dl
IgA	93-393	mg/dl
IgM	男 33-183 女 50-269	mg/dl

## IgE検査

特異的IgE判定基準		
クラス	IgE抗体価(UA/ml)	判定
6	100.0以上	陽性
5	50.0-99.9	
4	17.5-49.9	
3	3.50-17.4	
2	0.70-3.49	擬陽性
1	0.35-0.69	
0	0.34以下	陰性
IgE(非特異的IgE) 250 U/ml以下		

## 血液ガス

検査項目	基準値	単位
PO2	80-100	mmHg
PCO2	35-45	mmHg
PH	7.35-7.45	
HCO <sup>3-</sup>	20-26	mmol/l
B・E	-3-+3	mmol/l
SaO2	94.6-98.2	%
TCO2	24-30	mmol/l

## 尿検査

検査項目	基準値
色	淡黄色
混濁	(-)
比重	1.010-1.025
PH	6.0前後
蛋白	(-)
糖	(-)
ウロビリノーゲン	NORMAL
ビリルビン	(-)
ケトン	(-)
潜血	(-)
亜硝酸	(-)
白血球反応	(-)

## 尿沈査

成分	基準値
赤血球	1/HPF以下(月経時注意)
白血球	5/HPF以下
円柱	5/WF以下(硝子円柱のみ)

独立行政法人  
国立病院機構  
福岡病院臨床研究部

治験管理室

