

# 骨シンチ検査を受けられる方へ

## 骨シンチについて

・骨に集まる放射性医薬品を注射し、全身の骨(骨細胞)に炎症・腫瘍・骨折等の異常がないかを調べる検査です。

## 被ばくについて

- ・使用する放射性医薬品は微量で速やかに排泄されますので、放射線被ばくによる影響は極めて低いです。医師の判断の下、検査の必要性が被ばくのリスクを十分に上回ると考えられる場合にのみ検査を行います。
- ・当院では医療被ばくガイドラインをもとに線量管理を行い、放射線による被ばくを必要最小限になるように努めています。

## 検査所要時間

- ・放射性医薬品の注射後 3～4 時間後に撮影を行います。撮影時間は 30 分程度です。
- ・待ち時間を含めて 5 時間程かかります。

## 検査前の注意事項

- ・食事・飲水の制限はございません。

## 検査の流れ

1. 点滴を取ります。その後、点滴より放射性医薬品を入れていきます。
2. 注射後は放射性医薬品が骨に集積するまで 3～4 時間ほど間隔を開けます。骨によく集まるように水分をよく取り、排尿してください。待ち時間はお食事など、ご自由にお過ごしください。
3. 検査直前にトイレをすませてください。
4. 身体につけている金属類は全て外し、検査台へ仰向けに寝て頂きます。
5. 検査中は身体を動かさないでください。  
検査中に気分がすぐれない場合、近くの診療放射線技師にお知らせください。

## 検査が終わったら

- ・気分が悪いときは我慢せずに、近くの医療スタッフにお知らせください。
- ※その他、検査に関してご不明な点がありましたら放射線科へお問い合わせください。